ДАЧНЫЙ СПЕЦ

№ 6 (июнь)
2026

Смородина и малина

• СОРТА • УХОД • ЗАЩИТА

ISSN 2412-9887

УРОЖАЙ ДО МОРОЗОВ

ЯГОДНОЕ АССОРТИ: ВКУСНЫЕ СОРТА

СТАВИМ ДИАГНОЗ СМОРОДИНЕ

ЧУДО-ЯГОДА РОЗОЛИСТНАЯ МАЛИНА

ЯГОДНИКИ: ЖИЗНЬ В ШОКОЛАДЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на ИЮЛЬ внутри



12+

КАРДОС
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2960

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

КАМИНОВ, БАРБЕКЮ, УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ПЕЧЕЙ И СЭНДВИЧ ТРУБ В ДОМАХ, БАНЯХ, ГАРАЖАХ И ДР., ЧИСТКА КОТЛОВ В КОТЕЛЬНЫХ, ВЕНТШАХТ В ДВУХ–ПЯТИЭТАЖКАХ



Перепечатка запрещена.
Все права защищены

СТАНЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО!

ОТСКАНИРУЙ ПОДПИШИСЬ ВКОНТАКТЕ

ЧИСТКА И ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ПЕРЕДЕЛКА НА КПД, ОБНОВЛЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ ПЕЧНЫХ ПРОБЛЕМ: трещины, конденсат, течи, обугливание, задымление...

Песня: ДОКТОРПЕЧНИК спешит на помощь!!!

https://докторпечник.рф

8(929) 500-00-81, 8(929) 666-66-28

РЕМОНТ ДО 300 КМ ОТ МОСКВЫ И ЗИМОЙ!!!

Руки в саже. Заявки на ремонт или чистку оставляйте через мессенджеры или смс.

Реклама

№ 6 (июнь) 2026

ДАЧНЫЙ СПЕЦ
СМОРОДИНА И МАЛИНА
СОРТА • УХОД • ЗАЩИТА

Содержание

СОРТА

стр. 6 **Главное о ягодниках**
Чем отличаются между собой разные виды смородины

8 **Смородина черная: вкусная и сладкая**
Урожайные, крупноплодные и вкусные сорта

10 **Разным цветом**
Популярные сорта смородины золотистой

12 **Малиновое ассорти**
Какие саженцы стоит выбирать для своего сада

16 **Ягоды – чистый коралл**
Розолистная малина: ягодная или декоративная культура?

18 **Малина, которая любит кланяться**
Черная малина – неприхотливая и урожайная

21 **Желтая сладость**
Сладкие сорта малины с желтыми плодами

22 **Сегодня она – крыжовник, завтра – смородина**
Йошта достойна стать жемчужиной отечественных садов

УХОД

26 **До морозов своя малина**
Как правильно ухаживать за ремонтантной малиной

28 **У малины жизнь в шоколаде**
Известный питомниковод ответит на самые распространенные вопросы дачников о малине

30 **Что происходит со смородиной?**
Почему черная смородина несколько лет не радует обильным урожаем

38 **Ягоды веером крупнее, сочнее**
Тонкости посадки и ухода за черной и красной смородиной на шпалере

44 **Свой черенок не подведет**
Как садоводу получать свой здоровый посадочный материал ягодников

ЗАЩИТА

50 **Как защитить урожай ягод**
Самые распространенные вредители и возбудители болезней, симптомы и меры борьбы с ними

60 **Черная смородина на грани исчезновения?**
Как изменение климата влияет на рост, развитие и плодоношение ягодника

64 **Правила обработки ягодников**
Для химической борьбы с вредителями и болезнями необходимы знания и навыки

© «Дачный спец» № 6 (128)/2026

СМОРОДИНА И МАЛИНА: сорта, уход, защита

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ № ФС77-77756 от 29 января 2020 г.
Издается с октября 2015 г.

Учредитель, редакция и издатель
© ООО «Издательская группа «КАРДОС»
Генеральный директор Вавилов А. Л.

Адрес редакции
РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
e-mail: ds@kardos.ru

Адрес издателя
РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4

Главный редактор Идрисова А. М.
тел. 8 (495) 721-50-97

Заместитель главного редактора
Дарья Князева

Арт-директор Наталья Кравчук

Заместитель генерального директора по дистрибуции Ольга Завьялова
тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru

Заместитель генерального директора по рекламе и PR Алла Дандыкина
тел. 8 (495) 792-47-73

Отдел подписки
тел. 8 (495) 937-95-77, доб. 237
e-mail: distrib@kardos.ru

Дата выхода в свет 19.06.2026 г.
Дата изготовления 12.06.2026 г.
Срок годности не ограничен

Подписной индекс **П2960** в каталоге «ПОЧТА РОССИИ» и на сайте https://podpiska.pochta.ru

Над номером работали
С. Акимова, И. Квашенникова, С. Попов, А. Романова, В. Семенов, Т. Семенова, П. Траннуа, А Шеденко, Ю. Ушаков и др.

Отпечатано в типографии
ООО «РОСТПРЕСС»,
606034, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 66, кв. 26.

Заказ № 884. Тираж 268 000 экз.

Розничная цена свободная
Журнал для читателей 12+. Объем 3 п. л.

Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт журнала **dacha.kardos.media**

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Воспроизведение, в том числе запись и репродуцирование на электронном носителе, переработка, доведение до всеобщего сведения полностью или частично журнала «Дачный спец», в том числе статей, фотографий, иллюстраций, дизайн-макета, запрещено без письменного согласования редакцией и/или издателем.

ОТ РЕДАКЦИИ



Дорогие читатели!

Чтобы фавориты плодового сада неустанно радовали, подбирать сорта нужно под свой климат и свои возможности. Мы собрали лучшие варианты саженцев для разных задач, а также секреты ухода, чтобы кусты не дичали. Вы узнаете, чем кормить растения для получения рекордного урожая и как защититься от вредителей и болезней.

Редакция журнала «ДАЧНЫЙ СПЕЦ» желает вам отличного урожая сладкой ягоды!

СОРТА



- Главное о ягодниках
- Малиновое ассорти
- Смородина: вкусная и сладкая



Главное о ягодниках

Чаще всего в саду можно увидеть кусты черной смородины и малины. Несколько реже – красную и белую смородину. Каждая из этих ягодных культур имеет свои неоспоримые преимущества

Смородина черная – самый распространенный в культуре и широко известный вид смородины. В высоту этот вид смородины достигает 1–2 м. Молодые побеги отличаются бледностью, взрослые – имеют коричневый цвет. Черная смородина цветет с мая по июнь, а плодоносит в июле-августе.

Кусты красной смородины имеют ту же высоту, что и кусты черной смородины – 1–2 м. Побеги отличаются серым или желтоватым цветом. Цветет этот вид смородины в мае. В отличие от плодов черной смородины, ягоды красной смородины более кислые, потому что содержат меньше сахара.

Белая смородина с биологической точки зрения является разновидностью красной смородины, в плодах которой отсутствуют пигменты.

Смородина золотистая известна как самостоятельный вид этого растения. Растет гроздьями, как смородина, но по виду листьев больше напоминает крыжовник.

Что любит смородина

Черная смородина легче переносит затенение и избыточную влажность. Обладает высокой морозоустойчивостью. Однако сильно затягивается ее рост осенью, в результате верхушечная часть побегов не вызревает и зимой может подмерзать.

Красная и белая смородины любят открытые теплые участки, мало страдают от заморозков, так как рано заканчивают свой рост и верхушки их побегов хорошо вызревают.

НА ЗАМЕТКУ

❇ В саду хорошо делать посадки разных видов смородины. Рекомендуют высаживать их в таком соотношении: черной смородины 4–6 кустов, красной – 2–4, белой – 2–3, золотистой – 2 куста.

Золотистая смородина по своим качествам похожа на красную и белую смородины, кроме того, она очень декоративна.

Какие сорта малины выбирать

Выбирая в свой сад саженцы малины, целесообразно иметь часть летних сортов, а часть – ремонтантных, чтобы максимально долго лакомиться вкусными и полезными плодами. А в последнее время на участках стало модным и малиновое дерево. Рассмотрим подробнее, что садоводу дает вся эта палитра

Преимущества ремонтантной малины

Еще не так давно ремонтантные сорта малины уступали традиционным по вкусу, урожаю, но многие современные сорта уже превосходят их по всем признакам.

Ремонтантная малина дает урожай на однолетних побегах, то есть даже в год посадки. Также может дать часть урожая на двулетних побегах.

Большой плюс ремонтантных сортов в упрощенной агротехнике. Если у традиционных сортов необходимо вырезать отплодоносившие побеги и нормировать однолетние побеги, пригибать их на зиму, то у ремонтантной после сбора урожая (или рано весной) скашивают всю надземную часть, и необходимость укрывать побеги под снег отпадает.

Ремонтантная малина продляет срок потребления свежих ягод до 1,5–2 месяцев вплоть до заморозков.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ САЖАТЬ ЛЕТНИЕ И РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ОТДЕЛЬНО ДРУГ ОТ ДРУГА, ПОСКОЛЬКУ ПРАВИЛА УХОДА ЗА НИМИ РАЗНЫЕ. КОРНЕВАЯ СИСТЕМА МАЛИНЫ МНОГОЛЕТНЯЯ, КАК ПРАВИЛО, МАЛИННИК НА ОДНОМ МЕСТЕ ЖИВЕТ 12–15 ЛЕТ.

Малиновое дерево

Интерес у садоводов-любителей вызывают сорта, которые часто называют «малиновое дерево», «штамбовая малина». Свое название они получили благодаря толстому мощному стеблю. Они отличаются крупноплодностью, компактным видом и хорошим урожаем.

Компактный куст, пожалуй, главное достоинство «малинового дерева», меньше образуется поросли. Однако биология этих сортов мало чем отличается от традиционной малины. Зимостойкость у них средняя.

Летняя малина

Сажая традиционную летнюю малину, важно помнить, что ее надземная часть живет всего два года, после второго года она отмирает. Летняя малина дает урожай на второй год (на двулетних побегах), после того, как эти ветки отплодоносили, их нужно вырезать.

Анна Романова

Смородина черная: вкусная и сладкая

Выбор сорта – наиболее важная часть успеха в выращивании смородины. В первую очередь, от него зависит устойчивость растения к болезням и вредителям, а значит, можно надеяться на чистые ягоды без применения химикатов. И, разумеется, вкус ягод и крупноплодность – это тоже сортовые особенности

Посадив несколько кустов черной смородины с разными сроками созревания, можно собирать вкусные и полезные ягоды все лето.


Гулливер

Ранние

К концу июня ягоды уже созревают.

Гулливер, Дачница, Диковинка, Дубровская, Изюмная, Кармелита, Ладушка, Навля, Наследница, Пигмей, Русалка, Руслан, Селеченская-2, Сластена, Соловьиная ночь, Севчанка, Черный Бумер, Экзотика, Шаровидная и др.

Особенности: каждый из них может похва-

статься дополнительными «плюсами». Например, Дачница устойчива к мучнистой росе и почковому клещу, а у Диковинки, Пигмея, Русалки – крупные ягоды, Наследница очень зимостойка.

Средние

Урожай созревает в первой половине июля.

Багира, Белорусская сладкая, Брянский агат, Добрыня, Добрый Джинн, Дочка, Журавушка, Изюмная, Катюша, Муравушка, Няня, Очарование, Подарок Куминову, Русалка, Селеченская, Сенсей, Сокровище, Фея ночи, Черкашинская, Черный Жемчуг, Уссури, Экстрим и др.

Особенности: Багира отличается высокой урожайностью, Белорусская сладкая – крупными ягодами, Журавушка – не только крупными, но и плотными ягодами, которые без проблем можно перевезти с дачи в квартиру.

Среднепоздние

Созревают в конце июля.

Баррикадная, Венера, Вологда, Жемчужина, Зеленая дымка, Изумрудное ожерелье,


Добрыня


Зеленая дымка

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

ЯГОДЫ СРЕДНЕПОЗДНИХ СОРТОВ ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА И СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, ПОЭТОМУ ИХ ЯГОДЫ НАКАПЛИВАЮТ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВИТАМИНОВ.

Казкова, Краса Львова, Мовлади, Подарок Астахова, Титания, Чернавка, Юбилейная Копаня, Орловский вальс и др.

Особенности: сорт Баррикадная обладает засухоустойчивостью и высокой зимостойкостью, Жемчужина – сорт с крупными ягодами, Изумрудное ожерелье – устойчив к мучнистой росе, а Вологда считается одним из лучших сортов черной смородины.

Поздние

Ягоды можно собирать в первой декаде августа.

Аркадия, Алтайская поздняя, Бармалей, Лентяй, Мила, Нора, Татьянин день, Фортуна, Черешневая, Ядреная и др.

Особенности: у сортов Ядреная и Лентяй очень крупные ягоды, Мила устойчива к мучнистой росе, а Аркадия обладает сразу несколькими достоинствами – высокой урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью к почковому клещу и крупными ягодами.


Фортуна

Татьяна Семенова, к. с.-х. н.

Разным цветом

Самой разнообразной цветовой палитрой обладают ягоды смородины золотистой. В зависимости от сорта окраска может быть сине-черная, желтая, розовая, красная, оранжевая. При этом ягоды сладкие и мелкосемянные. Единственный недостаток сортов – низкая самоплодность. Поэтому для получения богатого урожая растениям необходимо обеспечить перекрестное опыление. На участке должно быть высажено 2–3 сорта.

Ананасная – куст раскидистый. Ягоды ярко-желтые. Мякоть желтая, очень сладкая. Урожайность – до 10 кг с куста.

Арбузная – куст раскидистый. Ягоды малиновые с темно-фиолетовыми полосами. Мякоть кисло-сладкого вкуса. Урожайность – до 12 кг с куста.

Венера – куст сильнорослый. Сорт раннего срока созревания. Ягоды крупные, овальные, черные, блестящие, кисло-сладкие.

Соб. инф.

WWW.HB-101.RU

100% НАТУРАЛЬНЫЙ

HB-101

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

ПРОИЗВЕДЕНО В ЯПОНИИ



6 мл ЭКОНОМИЧНЫЙ 120 л рабочего раствора

СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ», МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ – **HB-101**

ПРЕПАРАТ HB-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

HB-101 – ВЫПУСКАЕТСЯ В ЖИДКОЙ И ГРАНУЛИРОВАННОЙ ФОРМЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НА ДАЧЕ И ДОМА. ГОТОВИТЬ ТАКОЙ РАСТВОР ОЧЕНЬ ЛЕГКО. КАЖДАЯ БУТЫЛОЧКА СНАБЖЕНА КАПЕЛЬНИЦЕЙ, И ПРЕПАРАТ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ВОДУ ИЗ РАСЧЕТА 2 КАПЛИ НА ЛИТР ВОДЫ.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (800) 301-09-01

(многоканальный, бесплатный звонок по России)

или на сайте **WWW. HB-101.RU**

www.ozon.ru

www.wildberries.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

У Вас появилась возможность убедиться в подлинности купленного препарата HB-101, произведенного в Японии.

Каждой единице препарата HB-101 присваивается уникальный код. Код проверяется потребителем через Интернет или по SMS (бесплатно) после покупки товара.

В ответ поступает информация о подлинности покупки.

Как проверить?

1. **Коды, скрытые от прочтения до момента покупки, наносятся на продукцию.**
2. **После покупки товара вскройте код и проверьте его, отправив SMS на номер 3888 или на сайте www.3888.ru (бесплатно).**
3. **Получите ответ о подлинности товара.**

Если поступит уведомление о контрафакте (если код проверяется повторно или он не зарегистрирован в Системе DAT), свяжитесь с нами по бесплатной горячей линии

8 (800) 301-09-01

С уважением, Минэтака Ямадэ Генеральный директор ООО «ФЛОРА»

Реклама. ООО «Флора», ОГРН 1037701024305, Москва, ул. Самокатная, 4а, офис 301-302

Малиновое ассорти

Выбирая в свой сад саженцы малины, целесообразно иметь часть летних сортов, а часть – ремонтантных, чтобы максимально долго лакомиться вкусными и полезными плодами. А в последнее время на участках стало модным и малиновое дерево. Рассмотрим подробнее, что садоводу дает вся эта палитра

Преимущества ремонтантной малины

Еще не так давно ремонтантные сорта малины уступали традиционным и по вкусу, и по урожаю, но многие современные сорта уже превосходят их по всем признакам.

Ремонтантная малина дает урожай на однолетних побегах, то есть даже в год посадки. Также может дать часть урожая на двулетних побегах.

Большой плюс ремонтантных сортов в упрощенной агротехнике. Если у традиционных сортов необходимо вырезать отплодоносившие побеги и нормировать однолетние побеги, пригибать их на зиму, то у ремонтантной после сбора урожая (или рано весной) скашивают всю надземную часть, и необходимость укрывать побеги под снег отпадает.

Ремонтантная малина продлевает срок потребления свежих ягод до 1,5–2 месяцев, вплоть до заморозков.

КСТАТИ

❊ В саду можно посадить только ремонтантные сорта малины. В этом случае половину малинника стоит выращивать по традиционной технологии, то есть вырезать после второго года плодоношения. Таким образом ягоды будут созревать раньше – в конце июля – начале августа. А вторую половину растить собственно как ремонтантную, и ягоды будут радовать до морозов.

Что это дает? Плоды будут более крупными и качественными, растение будет меньше болеть, так как малинник лучше продувается, освещение лучше. Также при этой технологии ягоды малины не повреждаются малинным жуком. Поскольку ежегодно вырезаются и сжигаются все ветки, то снижается количество болезней и вредителей.


Ремонтантная малина Брянское диво


Малиновое дерево Таруса

Малиновое дерево

Интерес у садоводов-любителей вызывают сорта, которые часто называют «малиновое дерево», «штамбовая малина». Свое название они получили благодаря толстому мощному стеблю. Отличаются крупноплодностью, компактным видом и хорошим урожаем.

Компактный куст, пожалуй, главное достоинство «малинового дерева», меньше образуется поросли. Однако биология этих сортов мало чем отличается от традиционной малины. Зимостойкость у них средняя.

Летняя малина

Сажая традиционную летнюю малину, важно помнить, что ее надземная часть живет всего два года, после второго года она отмирает. Летняя малина дает урожай на второй год (на двулетних побегах), после того, как эти ветки отплодоносили, их нужно вырезать.

Корневая система всех названных сортов малины многолетняя, как правило, малинник на одном месте живет 12–15 лет.

Как получить крупные ягоды

Ни ремонтантная, ни летняя малина, ни малиновое дерево само по себе не будет давать крупных и сладких плодов, если не знать требований этой культуры. Малина – влаголюбивое растение. Перед

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ САЖАТЬ ЛЕТНИЕ И РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА ОТДЕЛЬНО ДРУГ ОТ ДРУГА, ПОСКОЛЬКУ ПРАВИЛА УХОДА ЗА НИМИ РАЗНЫЕ.

созреванием ягод и во время сбора урожая ей, как правило, необходим полив.

Она также нуждается в органических удобрениях. Весной предпочитает умеренные дозы азотных минеральных удобрений (30 г мочевины на 1 м^2 или на 10 л воды).

Малина, особенно ремонтантные сорта, – светолюбивое растение и теплолюбивое, поэтому предпочтительно ее сажать на солнечных участках с южной стороны и проводить вырезку загущающих, ослабленных побегов.

На 1 погонный метр у малины принято оставлять 7–15 побегов.

Сергей Потапов, к. с.-х. н., доцент кафедры плодоводства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, руководитель НПП «Вишневый сад»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОРТА

Из сортов летней малины наибольшей популярностью у садоводов пользуются вкусные и урожайные сорта Гусар, Солнышко, Метеор, Бальзам, Скромница, Спутница, Исполин.

Из желтоплодных очень вкусный и крупный Желтый гигант.

Из зарубежных сортов интерес представляет Лашка.

Из ремонтантных сортов популярны созданные И.В. Казаковым на Кокинском опорном пункте сорта Брянское диво, Оранжевое чудо, Августовское чудо, Геракл, Пингвин, Атлант и ряд других. Масса плодов большинства из них достигает 7–10 г, тогда как у старых летних сортов ягоды весят 2–3 г.

Из сортов иностранной селекции можно порекомендовать такие, как Полка, Полана, Зева.

Малина на штамбе представлена урожайными и уже проверенными временем сортами Таруса, Сказка.



Летняя малина

СМОРОДИНА В ПОРЯДКЕ: ЧТО СДЕЛАТЬ ВЕСНОЙ

Весенняя обработка смородины работает на будущий урожай. Болезни ослабляют куст, а тля уничтожает молодой прирост — без него не будет ягод и следующим летом. Защита до цветения сохранит кусты здоровыми, и ягоды будут в изобилии.



Профи останавливает болезни

Ржавчина, мучнистая роса, антракноз, пятнистости — знакомые садоводу напасти. Пятна, белый налёт на листьях, язвочками на побегах — сигналы, что кусту нужна помощь. Эти симптомы появляются в начале лета, но заражение происходит раньше. Системный препарат **«Профи®»** эффективен против комплекса болезней ягодных культур, подходит для профилактики и лечения. Он действует быстро: через 2 часа после опрыскивания блокирует болезнь и не даёт ей распространяться.

Дозировка: 2 мл на 2 л воды на 4 куста. Обрабатывают дважды: до или сразу после цветения и после сбора урожая при температуре выше +15 °С.

Аркана спасает от тли

Галловая тля (красные вздутия на листьях смородины) и побеговая тля (искривление верхушек побегов) — не просто вредители, а переносчики вирусов. Они быстро заселяют листья, уничтожают прирост и ослабляют кусты.

Спасти молодые побеги и будущий урожай помогает **«Аркана®»,** которая не смывается дождем и надолго защищает кусты. Препарат проникает внутрь листьев и борется с вредителями, даже если раствор не попал прямо на них.

Дозировка: 1 мл на 5 литров воды на 3 куста. Опрыскивают кусты до цветения для защиты молодого прироста и после сбора урожая, чтобы уничтожить тлю, которая готовится отложить яйца на зиму.

Гром-2М избавляет от муравьёв

Справились с тлей, но муравьи быстро принесут её снова. Чтобы разорвать вредный союз, борьба должна быть комплексной. **«Гром® 2 М»** в форме микрогранул помогает избавиться от муравейников под растениями. Препарат заделывают в почву на глубину 2–3 см и увлажняют для ускорения действия.

Расход: 30 г на 10 кв.м. Крошечные гранулы проникают всюду, где ползают муравьи, поэтому работают очень эффективно. Результат заметен уже через 3 дня. Средство без запаха и удобно в работе.

Сканируйте и читайте статью, как выращивать смородину


ржавчина


антрактоз


септориоз


галловая тля





Подробнее о защите растений на **www.grepharm.ru**

Обработали до цветения — собрали урожай на удивление!

ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода» ОГРН 103 770 004 056 4 Адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 30, помещение V, офис 2, этаж 1 Реклама

Ягоды – чистый коралл



Розолистная малина для меня – культура, скорее, декоративная, чем плодовая. Все лето она стоит в цветах и ягодах, а нежно-зеленая гофрированная листва еще больше придает ей эффектность. Сейчас многие спрашивают об этой красавице, с удовольствием о ней расскажу

Чем подкупает эта малина? Тем, что она цветет очень долго – с июня до поздней осени куст усыпан эффектными крупными белыми цветами. Они постоянно распускаются рядом со зреющими ягодами.

Плоды ярко-коралловые, очень крупные, некоторые размером с грецкий орех, притягивают взгляды издалека. В высоту этот полукустарник достигает от 60 см до 1,5 м в зависимости от условий и ухода. Представьте только, куст все лето стоит в цветах и ягодах! Такую красоту приятно посадить у забора или на газоне.

Плюсы и минусы

Остановлюсь на достоинствах и недостатках нашей красавицы. Плоды обладают приятным землянично-ананасовым ароматом, добавляющим изящную нотку вареньям и джемам. Однако в свежем виде у них какой-то невнятный вкус, который не идет ни в какое сравнение с настоящей малиной.

К тому же, кустарник очень колючий. Острые шипы растут не только на ветках, но и на обратной стороне листвы. Находиться возле нее рекомендуется только в перчатках и закрытой рабочей одежде. Хотя этот недостаток легко превратить в достоинство – живая изгородь из розолистной малины хорошо защищает дачу от проникновения животных. Да и мелких воришек.

Ее место – в бочке

Розолистная малина быстро размножается корневой порослью, склонна чрезмерно разрастаться, поэтому ей надо отводить место, где она не помешает другим растениям. Еще лучше, если посадить ее в бочку или просторный горшок и прикопать на постоянное место. Первый урожай появляется на третий-четвертый год после высадки кустов в почву.

Анна Шеденко,
г. Переславль-Залесский



КАКОВ УХОД

Розолистная малина не требует особого ухода, предпочитает солнечные плодородные участки. Только в первые годы, пока не укоренится, нужен усиленный полив. В целом уход за этой культурой заключается в прополках, мелком рыхлении и поливах (в сухую погоду). Для того чтобы верхний слой почвы не пересыхал, рекомендуется мульчировать почву, особенно у молодых редко растущих растений.



Малина, которая любит кланяться

Черная малина, как только хорошенько подрастет, начинает макушкой к земле клониться. Зацепится за землю и там же укоренится, даст новые побеги. Таким манером дальше зашагает. Не успеешь опомниться, как вместо одного куста образовались целые заросли. Колючие, не продерешься

А еще она очень урожайная. Вот только в таких зарослях ягод не соберешь. Поэтому высаживают ее в рядок. И к шпалере подвязывают. В том, что эта вежливая малина любит погулять таким странным образом, ничего особенного нет. Достаточно вспомнить, кто ее родители. Во-первых, ежевика! Если ее боковые побеги прижать к земле, макушки тоже укоренятся. А еще от ежевики до-

стались «ребенку» колючки и сизый, почти черный цвет ягод.

Второй родитель – малина. Тоже колючая, но куда ей до ежевики. Передала наследнику разве что округлую форму ягод. А еще имя – малина. Хотя какая же это малина? Самый настоящий гибрид – ежемалина!

На урожай никто не жалуется

Получился этот гибрид отличным. Садоводы, которые не поленились весь урожай взвесить, утверждают, что известный сорт **Кумберленд** дает ягод в два раза больше малины красной. Сама я обычно не взвешиваю урожай, но ягод действительно много. Они средней величины, довольно плотные, поэтому их легко перевозить. На вкус – что-то среднее между ежевикой и малиной, дети их очень любят. Лишние ягоды мы обычно замораживаем, иногда закатываем компоты. Но заготовок

С БУБНОМ ПРЫГАТЬ НЕ НАДО

✻ Чем мне нравится Кумберленд, так это характером – без особых претензий. Подкормки – самые обычные, поливы – тоже. Даже засуху перенесут. Но во время плодоношения лучше поливать чаще, тогда ягоды будут крупнее и сочнее.

Подкормки обычные. Я поливаю настоем птичьего помета (1 : 15) – весной. Через 2–3 недели подсыпаю золу.

АБСОЛЮТ ГРИН

ГАЗОН БЕЗ ЛОПАТЫ: ПУСТЫРЬ В КОВЕР ЗА 4 ШАГА

тел. +7 (499) 390-75-70 Москва, Очаковское ш., д. 34, офис В 606 https://absolutegreen.ru

Забудьте о тяжелой перекопке! **Метод «Слоеный пирог»** позволяет создать газон даже на заброшенном участке без культиватора и мозолей. Секрет — в правильной подготовке и живучих семенах «Абсолют Спорт».

Что делать:

1. Бритье. Скосите сорняки максимально низко.
2. Изоляция. Накройте участок картоном внахлест и обильно залейте водой. Картон заблокирует свет сорнякам.
3. Подушка. Насыпьте сверху 5 см любого грунта или смеси песка с землей.
4. Посев. Густо посейте семена (50 г на 1 кв. м), прикатайте и полейте.

Почему это работает?

Картон перепреет за месяц, превращая дерн в удобрение. Корни травы легко прошьют бумагу и уйдут вглубь.

Результат: плотный дерн без сорняков и боли в спине уже через 14–20 дней!

магазин Абсолют Грин

сайт Абсолют Грин

магазин Абсолют Грин

Реклама. ООО "Абсолют-Грин" 119634, г. Москва, Ново-Переделкино Вн. тер. г. муниципальный округ, Лукинская ул., д. 9, помещ. 69. ОГРН 1147746313846

получается немного, в основном съедаем все в свежем виде.

Конечно, можно бы увеличить масштабы посадок, но нам хватает того, что есть. Выстригать и подвязывать колючие ветки охотников мало. Даже в жару приходится надевать плотную куртку и натягивать рукавицы из прорезиненной ткани. Иначе, как бы ни осторожничал, все равно исцарапаешься.

Кстати, о стрижке

Вот уж кому нужны услуги парикмахера, так это ежемалине. Без ножниц сразу проявит неукротимый характер и зарастет под самую макушку. Так что ближе к июлю отросшие побеги надо укоротить. Говорят, что стричь их лучше на расстоянии 1,8 м от земли. С портновским сантиметром я в сад не хожу, поэтому отрезаю макушки на том уровне, куда рука дотянется. И сразу подвязываю – к шпалере.

Пишут, что если укорачивать побеги до 120–130 см, они могут образовать устойчивый куст и не будут полегать.

Жаль, что мода прошла

Сейчас черную малину редко встретишь в наших садах. А жаль!

ОТВЯЗАЛ И УЛОЖИЛ

✻ Кумберленд зимует у нас хорошо. Достаточно отвязать побеги от шпалеры и уложить прямо на землю. Прикрывать их не надо.

Культура очень неприхотливая, особого ухода не требует, а урожаи дает ежегодно. Раз нет спроса, то и питомники этой ягодой особо не занимаются. В этом я убедилась лично. Когда дети были маленькие, черная малина всегда росла в саду. Потом переезды, дети выросли – и я о ней позабыла. С рождением внуков вновь появилось желание ее выращивать. Даже не желание, а потребность. Дети требовали черных ягод, а покупать ежевику часто и много было не по карману, очень уж она дорогая.

Оказалось, что Кумберленд просто так не купишь. Услуг онлайн-магазинов тогда не было, так что пришлось «побегать» не один год. Самое удивительное, что нашла саженцы не в питомниках, а у своей подруги, которая выращивала культуру еще с девяностых. Что бы мне к ней раньше не обратиться?!

Одни плюсы

Колючки и обязательная стрижка – вот, пожалуй, и все минусы черной малины. Зато сколько плюсов! Неприхотливая. Устойчивая к заболеваниям и вредителям, даже осы не повреждают ягоды. Спелые, они не осыпаются и не размягчаются. Не надо укрывать на зиму. Да, еще один плюс – не разбегается по участку при помощи корневой поросли.

Кусты ягод дают очень много, до семи килограммов – при правильном уходе, конечно. Причем куст этот – долгожитель, может плодоносить до 14 лет.

Ирина Квашенникова, г. Уфа

Желтая сладость

Сорта малины с желтыми ягодами в первую очередь должны заинтересовать аллергиков. В ягодах практически не содержится антоцианов, которые и вызывают аллергию. Но сахара ягоды набирают значительно больше, поэтому сорта желтой малины более сладкие

Желтая десертная – сорт раннего срока созревания с очень вкусными и ароматными ягодами. Окраска плодов белая и бело-желтая, форма продолговатая. Куст раскидистый. Сорт зимостойкий.

Желтый гигант – среднеранний сорт. Ягоды крупные, желтые, долго не осыпаются при созревании. Мякоть плотная, десертного вкуса, с приятным ароматом. Куст раскидистый. Осенью возможно повторное плодоношение, но не столь обильное. Требует укрытия снегом на зиму. Устойчивость к вредителям и болезням высокая.

Оранжевое чудо – сорт ремонтантный. Куст слабораскидистый. Начало созревания ягод – во второй половине августа, плодоношение продолжительное. Ягоды крупные золотисто-желтые.

Золотая осень – крупноплодный сорт с яркими золотисто-желтыми ягодами. Урожайность высокая – 2,5 кг с куста и больше. Начало созревания ягод – во второй половине августа, плодоношение продолжительное.

Анна Романова



Желтая десертная



Оранжевое чудо

Сегодня она – крыжовник, завтра – смородина

Селекционеры еще в XIX веке задались целью увеличить размеры ягод черной смородины, повысить ее устойчивость к болезням. А крыжовник всем и всегда хотелось избавить от колючек. В результате скрещивания этих культур появилась йошта – прекрасная незнакомка, которая еще только ждет своего часа, чтобы стать жемчужиной наших садов

БИОПОРТРЕТ

- Йошта – мощный кустарник, прямостоячий, но чаще полураскидистый, высотой до 2–3 метров, с хорошо развитыми толстыми ветвями. По силе роста превосходит черную смородину и крыжовник. Продолжительность жизни до 20–30 лет.
- Вступает в плодоношение на 2–3 год. Плодоносит, как правило, ежегодно.
- Древесина хрупкая, почки легко обламываются. После повреждений и сильной омолаживающей обрезки восстанавливается плохо.
- Побеги бесшипные. Йошта отличается затяжным ростом и в средней полосе России однолетние побеги до наступления холодов не вызревают и часто подмерзают. Корневой поросли не дает.
- Гибрид самоплоден, но лучше плодоносит по соседству со смородиной и крыжовником.

Первые опыты по созданию гибрида смородины и крыжовника были предприняты И. В. Мичуриным, разработавшим теорию скрещивания отдаленных форм растений. Потом подключились и селекционеры других стран, однако попытки не приводили к успеху – гибриды получались нежизнеспособными или бесплодными.

Позже в этом направлении продвинулись немецкие специалисты, благодаря которым и появилось



название йошта. В 1970 году в Германии селекционер Рудольф Бауэр получил плодоносящий гибрид, который назвал по первым буквам немецких слов Johannisbeere (смородина) и Stachelbeere (крыжовник), то есть Josta.

Йошта в два раза крупнее

Миру садоводов известны и другие гибриды крыжовника и черной смородины: гибрид Т. С. Звягиной (СССР), Крондаль (США), Крона (Швеция), Рике (Венгрия). Все они имеют много общего, но различаются по форме куста, размеру, массе и вкусу ягод, зимостойкости растений и урожайности.

Крона получена Фредериком Нильсоном. Гибрид бесшипный, урожайный, ягоды в два раза крупнее, чем у смородины, вкус превосходный. Причем в первой

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

ЙОШТА – ГИБРИД ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, КРЫЖОВНИКА РАСТОПЫРЕННОГО И КРЫЖОВНИКА ОБЫКНОВЕННОГО. СЕЙЧАС ЯГОДНЫЙ КУСТАРНИК ДОВОЛЬНО ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕН В ГЕРМАНИИ, ГОЛЛАНДИИ, ЧЕХИИ, ВЕНГРИИ. В РОССИЮ БЫЛ ЗАВЕЗЕН В НАЧАЛЕ 1980-Х ГОДОВ, КУЛЬТИВИРУЕТСЯ САДОВОДАМИ С 1986 ГОДА.

половине лета ягоды по вкусу напоминают крыжовник с легким ароматом смородины, во второй половине лета – наоборот.

Американский гибрид **Крондаль** внешне больше похож на крыжовник, с такими же листьями и формой куста, но его ягоды черные, как у смородины, и с похожим вкусом.

Что касается гибридов Т. С. Звягиной и **Рике**, то сведений об их произрастании на территории нашей страны нет.

Почему ее нет в каждом саду?

Йошта по вкусу не уступает лучшим сортам смородины и крыжовника, также идет вровень по содержанию витамина С – 80–100 мг%. У нее масса достоинств, о которых скажем ниже. Тем не менее ягода пока не получила большого распространения.

Очищает организм

И все же йошта заслуживает своего места в каждом саду. Это интересная новинка, как и ежемалина, голубика и другие нетрадиционные для нас ягодники. Благодаря высокому содержанию пектиновых, Р-активных веществ и антоцианов сок ягод является средством для очищения организма, выведения радионуклидов и солей тяжелых металлов. Плоды оказывают благотворное действие при желудочно-кишечных расстройствах и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ягоды можно сохранить на зиму – при замораживании они не теряют своих свойств. Из полузрелых ягод получается отличное варенье, а из зрелых – соки, джем, компот, желе.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

- **Время посадки:** весна до распускания почек или ранняя осень
- **Лучшее место:** открытое, хорошо освещенное
- **Почва:** слабокислая, плодородная, средне- и легкосуглинистая, рыхлая, богатая органикой и хорошо увлажненная
- **Посадка:** яма не менее 60 х 40 см
- **Расстояние:** между растениями оставляют 1,5–2 м
- **Удобрения:** раз в 2–3 года вносят перепревший навоз – 8–10 кг; двойной суперфосфат 100 г; сернокислый калий 20–30 г; древесную золу 200–300 г
- **Полив:** регулярный и обильный
- **Обрезка:** практически не требует обрезки
- **Размножение:** отводками, зелеными и комбинированными черенками

Здорова и нетребовательна

Культура устойчива к перепадам температуры, достаточно зимостойка. К почвам нетребовательна. Устойчива к почковому клещу, антракнозу, ржавчине, рябухе, «махровости» и многим вирусным заболеваниям. Ухаживают за йоштой, как и за черной смородиной.

Светлана Акимова, к. с.-х. н., доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева

УХОД



- У малины жизнь в шоколаде
- Ягоды веером крупнее
- Свой черенок не подведет

До морозов своя малина

Было время, ремонтантную малину садоводы не жаловали. Потому что начинала плодоносить практически осенью и не успевала до заморозков вынянчить свой урожай. Так что ягод хозяевам доставалось не так много, к тому же из-за прохладной и дождливой погоды были они кисловатые



Полька зимой 2019 г.

Но селекция на месте не стояла, появились новые сорта – более ранние и со сладкими ягодами. Да и садоводы научились выращивать ремонтантную малину так, чтобы до серьезных холодов она отдала большую часть урожая.

Совет на будущее

Конечно, сроки сбора урожая зависят от сорта. Но ремонтантную малину можно и поторопить. Несколько действий ускорят процесс вегетации на 2,5–3 недели и позволят получить первый урожай малины (в Ленинградской области) в середине августа. Ягод будет много и вплоть до заморозков. Что нужно делать?

1 **Хорошо прогреть почву.** Для этого ранней весной с грядки убирают остатки снега и застилают агроволокном (плотность не менее 60 г/м^2) – прием ускорит прогревание земли, вегетация начнется раньше. Сделать это несложно, так как прошлогодние побеги осенью полностью должны быть вырезаны.

2 Освободить грунт. Когда из земли появятся молодые побеги, укрывной материал снимают, убирают прошлогоднюю траву, рыхлят землю.

3 Удобрить. Вносят органическое или минеральное удобрение, содержащее азот. Если земля бедная (суглинок), можно добавить торф (для лучшего проветривания корней).

4 Укрыть агроволокном. Ставят дуги и снова набрасывают агроволокно, по мере роста побегов увеличивают высоту дуг. Держат малину под укрытием до цветения (для Ленинградской области это середина июля).

5 Уход. Поливы, подкормки и обработки – по графику, как обычно.

Поменять смесь на смесь

Садоводы привыкли бороться с болезнями растений при помощи бордоской смеси. Мало кто пользуется смесью бургундской, которую французские фермеры применяют на своих виноградниках. В составе медный купорос и пищевая сода в пропорциях 1:1.

Результат от применения бургундской смеси более эффективный, так как растения усваивают его быстрее. Еще одно преимущество: эта смесь не забивает форсунку опрыскивателя хлопьями извести.

Как приготовить бургундскую смесь

Взять две емкости с теплой водой (50–60 °С). В одну добавить пищевую соду (100 г на 1 л воды), в другую – медный купорос (100 г на 1 л воды), мешать до полного растворения компонентов. Затем медленно перелить раствор с медным купоросом в содовый. Это важно: голубое вливать в белое! Обязательно помешивать. Добавлять 4 л обычной воды. Получится 10 л 3%-ного раствора.

Используют препарат при температуре воздуха не меньше 5 °С.

Алексей Шпиганович, КФХ «Полесье», Ленинградская обл.

ИСПЫТАННЫЕ СОРТА

Самым ранним у нас долго считалась **Полька**: в Ленинградской области сорт начинает плодоносить к началу-середине августа. Завязей на кустах столько, что удивляются даже бывалые садоводы. Ягоды дает до морозов. После коротких заморозков восстанавливает плодоношение. Полька устойчива к болезням. Вес ягоды – 3,6–6 г, она конической формы, с мелкой костянкой, сладкая.

Но появился еще один ранний сорт – **Прималба**, плодоносит даже на 10–14 дней раньше Польки. Ягоды крупные, конической формы, весом 6–8 г, на вкус сладкие, на вид глянцевые, что приятно глазу.

Понравился сорт **Зюгана**, отлично переносит транспортировку. Ягоды крупные, ярко-красные с малиновым оттенком, ароматные, сладковатые.

Хорош сорт **Геракл**. Ягоды при хорошем уходе могут достигать 15 г, рубинового цвета, плотные, сочные, кисло-сладкие.

Садоводы ходят по малину не в лес, а на собственный участок. А какой соберут урожай, зависит не столько от погоды, сколько от грамотного ухода. А еще от правильно подобранных сортов, которых селекционеры, спасибо им, создали множество



У малины жизнь в шоколаде

А поможет вам в этом питомниковод Андрей Седов. Заодно подскажет, как за малиной надо ухаживать.

Какие сорта малины сейчас наиболее востребованы, за какими охотятся?

Все сорта малины принципиально делятся на две большие группы: обычного типа плодоношения (плодоносят на побегах прошлого года) и ремонтантные (могут плодоносить на побегах прошлогодних, но осенний урожай дадут на выросших в этом году). Думаю, надо иметь в саду и те, и другие, чтобы получать урожай как можно дольше.

Советую обратить внимание на сорта наших известных селекционеров Виктора Валерьяновича Кичины и Ивана Васильевича Казакова. Среди них есть сорта с ягодами крупными, как правило, они еще и бесшипные.

Какие обязательные условия выращивания малины?

Трудно, практически невозможно вырастить хороший урожай без шпалеры. Побеги надо не только подвязывать, но и нормировать, вырезая лишние.

Сколько нужно оставлять побегов?

На каждый погонный метр – примерно 8–10. Не больше! Причем вырезают лишние побеги как можно ниже к земле.

А какие побеги считаются лишними?

В первую очередь слабые, а еще те, которые загущают куст. Остаться должны только самые сильные и без признаков заболеваний.

Когда лучше вырезать малину – весной или осенью?

Для малины это не принципиально, можно сделать и осенью, и сразу после плодоношения. У обычных сортов двулетние побеги вырезают полностью.

ОБЫЧНЫЕ СОРТА

✻ Таруса, Гордость России, Вольница, Скромница, Геракл, Полка. Хорош и старый сорт Новость Кузьмина.

Их видно хорошо, они к этому времени стоят сухими.

У ремонтантной осенью вырезают все побеги – полностью. Поверхность мульчируют – перегноем, компостом, торфом (слоем 5–7 см). Основной урожай формируется в августе-сентябре.

Что еще входит в обязательную агротехнику?

Желательно выбирать сорта, которые могут перенести наши морозы. И неплохо бы осенью побеги связать и пригнуть к земле, тогда они хорошо перезимуют.

Очень часто побеги вырастают высотой до двух метров. Если им не обрезать макушки, ягод будет много, но не очень крупных. Поэтому весной, когда подвязываем малину к шпалере, ветки надо укоротить примерно до метра.

Как долго малина может расти на одном месте?

У нас есть опыт, когда садовод-любитель хорошо ухаживал за малиной, на одном месте она плодоносила у него лет 25. Но лучше менять плантацию гораздо чаще.

Какие вредители самые вредные для малины?

Личинки малинного жука, малинный комарик, малинная муха. Уменьшить их количество помогает осеннее мульчирование достаточно большим слоем – 7–10 см, это абсолютно точно уже установлено. Зимуют насекомые в приземном слое, выходят в мае. Насыпанная сверху мульча создает им такие некомфортные условия, что их «поголовье» значительно сокращается.

А ремонтантные сорта тем и хороши, что на них практически не бывает той же малинной мухи.

Как поливать и подкармливать малину?

Поливать надо регулярно, лучше не методом дождевания, а сразу под основание куста. Весной можно внести удобрения с большим количеством азота, во второй половине лета – фосфорно-калийные. Осеннее мульчирование перегноем – это тоже подкормка.

РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА

✻ Атлант, Оранжевое чудо, Бабье лето 2, Поклон Казакову, Карамелька, Августовское чудо. Из желтых – Золотая осень.

Что любит малина и чего категорически не любит?

Любит влагу и плодородную почву. Очень помогает поддерживать водно-воздушный баланс мульчирование, избавит этот прием и от вредителей. Не любит, когда не ухаживают. Особенно не нравятся затенение и загущение.

Беседовала Алла Михайлова

Что происходит со смородиной?



С таким вопросом мы обратились к нашим читателям после того, как редакции «Дачного спеца» пожаловались сразу несколько садоводов: нет урожая черной смородины. Всех ли коснулась эта проблема или кого-то обошла? И если уж затронула чьи-то сады, то чем можно помочь растениям, чтобы в следующие годы собирать достойный урожай ягод?

Кусты пусты

Жаркий апрель прошлого года подстегнул рост и развитие ягодников. Мы радовались большому количеству соцветий на смородине, предвкушая, сколько ягод соберем в июле! Но майские морозы и снегопады внесли свои коррективы. После погодного катаклизма на кистях смородины осталась половина живых цветочков. А спустя некоторое время стало понятно, что завязей образовалось еще меньше. Некоторые кусты и вовсе остались «пустыми».

Наталья Белозерская, г. Дмитров, Московская обл.

Опять со смородиной

Прошлогодняя весна напугала заморозками. Очень расстроилась, когда увидела обмякшие бутоны на смородине. Трогаешь их, а они безвольно качаются – подмерзли. Пострадала не только черная смородина, но и белая, и красная. Но через пару дней кисточки бутонов стали более упругими, появилась надежда на урожай.

И правда, ягоды все же завязались. Я подкормила кусты настоем крапивы, хлеба и куриного помета, разбавила водой больше обычного – чуть больше половины ковша на большую лейку.

Вчера в очередной раз подошла к смородине. Ягоды стали крупными, кусты даже развалились под их тяжестью. Скоро начнем собирать!

Ляйсан Ахметшина, г. Казань, Республика Татарстан

Не ягодное было лето

Смородина наша в весенние морозы выжила, хотя мы ее не накрывали. Но ягода не такая, как всегда – вроде и не мелкая, но ее мало. А бывало, что куст усыпанный весь стоит. Смородина у нас растет «годами» – год ее много, год поменьше урожая дает.

Нина Абрамочкина, Рязанская обл.

Размером с киш-миш

Смородина сорта Селеченская в прошлом году была как никогда крупная – во время морозов мы ее укрывали. Потом у нас шли дожди, а культура эта любит влагу – вот кусты в благодарность и уродили крупные ягоды – размером с виноград киш-миш. Но я за своей смородиной хорошо ухаживаю. Весной кусты подкормила монофосфатом калия и кальциевой селитрой. Во время цветения обрабатывала растения поочередно то янтарной кислотой, то одним из биопрепаратов «Циркон», «Эпин-Экстра», «Фировит» – раз в неделю. Тли было много – до завязывания ягод опрыскала «Фитовермом». Садоводы совершают ошибку, когда после сбора урожая забывают о смородине. А ее обязательно нужно поливать, подкармливать, тогда на следующий год снова будут ягоды.

Татьяна Марченкова, г. Смоленск

Получилась «через-ягодница»

Со смородиной в прошлом году случилась интересная история. Сверху кустов ягод нет – весной кисти померзли, а внутри куста завязались по 2–3–5 ягод на кисти. Получилась «через-ягодница». Зато они в 2 раза крупнее, чем обычно. А на вкус – чистый сахар.

Геннадий Федоров, г. Великий Новгород

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Валерий Смирнов, к. с.-х. н.:

– Что сделать, чтобы после весенних передряг и летних аномалий кусты смородины сумели восстановиться, набраться сил?

После сбора урожая необходимо убрать все сорняки вокруг кустов, в радиусе кроны рассыпать гранулы азофоски или нитроаммофоски (по инструкции). И прорыхлить почву. Если будет засуха, обязательно поливать. Для небольших кустов достаточно полведра воды, для средних – ведро, для взрослого куста понадобится 2–3 ведра воды.

У старых кустов смородины осенью срезать 5–6-летние ветки, оставить только молодые.

Против тли, паутинного клеща опрыскать любым средством против вредителей («Фуфанон», «Децис», карбофос – так же по инструкции).

СТАНЬ СПЕЦОМ В ДАЧНОМ ДЕЛЕ!

№ 7 (июль) 2026

Следующий номер журнала **«ДАЧНЫЙ СПЕЦ»** в продаже с **17 июля**!

РОЗЫ

СОРТА • УХОД • ЗАЩИТА



КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ
ЛУЧШИЕ СОРТА РОЗ С КРАСНЫМИ ЦВЕТКАМИ

КОРОЛЕВУ ДЕЛАЕТ СВИТА
КАКИМИ РАСТЕНИЯМИ НУЖНО ОКРУЖАТЬ РОЗУ В ЦВЕТНИКАХ

РОЗА ДИВНАЯ, ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ
ВЕЧНОЗЕЛЕНАЯ ЛИАНА ДЛЯ САДОВ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ

ЦВЕТКИ РАСПИСАЛИ В КРАСКАХ
НЕОБЫЧНЫЕ ДВУХЦВЕТНЫЕ СОРТА

НЕ ЗАБУДЬ!

Календарь работ
Июль

Овощные

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. Как профилактику фитофтороза и альтернариоза на томатах, огурцах, а также при слабом развитии этих болезней применяют опрыскивания биологическим фунгицидом «Фитоспорин-М». Если заболевания набрали силу, то применяют «Абига-Пик» (50 г на 10 л воды), но данный фунгицид не используют на растениях в период сбора урожая.

ПОСЕВ СЕМЯН. В июле повторно высевают семена укропа, редиса, редьки, шпината, листового салата, огурца, кукурузы, свеклы, моркови, бобовых, также можно посадить картофель.

ФОРМИРОВКА РАСТЕНИЙ. У томата продолжают пасынковать растения и одновременно удалять лишние завязи в соцветии. У вьющейся фасоли и бобов прищипывают побеги для лучшего созревания плодов. Ботву на луке порее и сельдерее скручивают.

УХОД. Проводят общие работы по уходу за овощными культурами: прополка сорняков, рыхление. При отсутствии дождей овощи поливают 1–2 раза в неделю. Слизней собирают вручную или же используют препараты, содержащие метальдегид.

УРОЖАЙ. Продолжают убирать зеленные культуры весеннего посева, брокколи, цветную, пекинскую капусту. Выборочно убирают молодые корнеплоды моркови и свеклы. Во второй половине месяца начинают созревать горох и бобы.

МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКИ. Лук-батун, слизун, шнитт – при слабом росте подкармливают аммиачной селитрой (15–20 г на 10 л воды).

Плодовые

ОБРЕЗКА. Формируют кроны деревьев, вырезают ветки, растущие внутрь, удаляют жирующие побеги. Удаляют поросль вишни и сливы. Делать это нужно секатором, предварительно осторожно откопав место, где растут побеги, и срезав их у самого корня.

Продолжение на стр. 36



Июль

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2026 ■ *от Марины Мичуринской*

1
Луна в Козероге

Ведут борьбу с почвообитающими вредителями и возбудителями болезней растений.

15–16
Луна во Льве

Высаживают засухоустойчивые растения, выращенные в контейнерах. Черенкуют декоративно-лиственные и хвойные культуры.

2–3 Луна в Водолее 	Рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Пропалывают сорняки, прореживают всходы.
4–6 Луна в Рыбах 	Проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников. Ведут борьбу с наземными вредителями и возбудителями болезней растений. Поливают и подкармливают садовые и комнатные растения.
7–8 Луна в Овне 	Убирают чеснок, копают ранний картофель. Рыхлят и мульчируют почву. Подкармливают овощные и плодовые растения.
9–10 Луна в Тельце 	Ведут борьбу с почвообитающими вредителями и возбудителями болезней растений. Выкапывают луковичные (тюльпаны, гиацинты, нарциссы).
11–12 Луна в Близнецах 	Рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Вносят удобрения. Удаляют сорняки, усы земляники и увядшие цветки однолетников и многолетников.
13 Луна в Раке 	Ведут борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений.
14 Луна в Раке 	Поливают садовые и комнатные растения.
17–18 Луна в Деве 	Сажают любые растения, выращенные в контейнерах. Размножают флоксы листовыми черенками. Сеют повторно репу, редис.
19–21 Луна в Весах 	Сажают красивоцветущие растения, выращенные в контейнерах. Пикируют посеянные в июне двулетники и многолетники. Размножают флоксы листовыми черенками.
22–23 Луна в Скорпионе 	Поливают растения. Ведут борьбу со слизнями. Повторно сеют и пересаживают лекарственные и зеленные культуры.
24–26 Луна в Стрельце 	Проводят прививку (окулировку) плодовых деревьев. Сеют и пересаживают лекарственные растения.
27–28 Луна в Козероге 	Сажают многолетники, кустарники и деревья, выращенные в контейнерах. Удаляют сорняки.
29 Луна в Водолее 	Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву. Удаляют сорняки.
30–31 Луна в Водолее 	Подготавливают к зиме погреба и хранилища. Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву. Удаляют сорняки.

– растущая – полнолуние – убывающая – новолуние

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. В июле внимательно осматривают деревья. Больные, слабые и засохшие ветви вырезают на кольцо острым секатором или сучкорезом. Удаляют все больные и деформированные плоды. Регулярно собирают падалицу. Снимают ловчие пояса с плодовых деревьев и уничтожают.

ПОДКОРМКА. В начале июля, чтобы с деревьев не опадала завязь, проводят корневую подкормку, используя раствор коровяка. А также опрыскивают крону раствором мочевины (50 г на 10 л воды) – это простимулирует закладку плодовых почек, которые дадут урожай в будущем году.

Ягодные

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ. Осматривают плодоносящие кусты крыжовника и черной смородины, собирая и уничтожая ягоды, поврежденные огневкой и пилильщиком. Вырезают и сжигают засыхающие молодые ветви, у основания которых на коре видны вдавленные пятна и трещины – признак поражения смородиновой побеговой галлицей.

ПОДКОРМКА. В период налива ягод малину, смородину и крыжовник нужно подкормить раствором коровяка (1:8) с добавлением 50–90 г суперфосфата и 100–150 г золы или 80 г калийных солей на ведро. После сбора урожая кусты крыжовника и смородины, не давшие хорошего прироста, подкармливают комплексным минеральным удобрением – 1 ст. ложка на 10 л воды.

Цветочные

УХОД. К гладиолусам, георгинам, дельфиниумам, мальве устанавливают опоры, растения подвязывают.

ВЫКОПКА ЛУКОВИЦ. Начинают выкапывать луковицы тюльпанов, рябчиков, нарциссов. Не отделяя надземную часть, раскладывают тонким слоем, сушат в тени.

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ. Цветущие растения подкармливают настоем коровяка (1:10) с добавлением двойного суперфосфата и сульфата калия по 15 г на ведро настоя. Подкормку сопровождают поливом. Регулярно удаляют отцветающие цветки.

РОЗЫ. Внимательно осматривают кусты роз и при первом появлении симптомов мучнистой росы растения обрабатывают фунгицидами. Вырезают тонкую корневую поросль и удаляют дикие побеги шиповника. После каждой волны цветения продолжают подкормку жидким удобрением.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на 2-е полугодие 2026 года на журнал «Дачный спец». Оформить подписку до почтового ящика можно во всех почтовых отделениях.



СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ


Срок подписки	Стоимость подписки на 2-е полугодие 2026 г.
на 1 месяц	73,07 ₽**
на 2 месяца	146,14 ₽**
на 3 месяца	219,21 ₽**
на 4 месяца	292,28 ₽**
на 5 месяцев	365,35 ₽**
на 6 месяцев	438,42 ₽**

** Цены указаны по каталогу «Почта России» для жителей г. Москвы (*с доставкой до почтового ящика*). Цена может незначительно меняться в зависимости от региона доставки. Уточняйте стоимость подписки в почтовых отделениях и на сайте https://podpiska.pochta.ru

Журнал выходит 1 раз в месяц
Подписной индекс **П2960**
в каталоге «Почта России»

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ до почтового ящика можно также НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

как подписаться, сидя дома или на даче, без посещения почтового отделения



Онлайн на сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru или через мобильное приложение «Почта России»

инструкция онлайн-подписки на сайте podpiska.pochta.ru и через мобильное приложение «Почта России»

- Выберите город, чтобы узнать цену на подписку для данного населенного пункта.
- Выберите журнал (по индексу – П2960 или названию – «ДАЧНЫЙ СПЕЦ»).
- Выберите способ доставки.
- Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
- Выберите период подписки.
- Пройдите простую процедуру регистрации, если оформляете подписку на сайте впервые, или авторизуйтесь на сайте.
- Оплатите заказ банковской картой.

Отсканируйте QR-код, перейдите на сайт Почты России и оформите подписку на издание «Дачный спец»

ПОДПИСКА – ЭТО ЗАБОТА О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Возникли вопросы по подписке? Звоните в редакцию: 8 (495) 937-95-77 (доб. 237)

Густые раскидистые кусты смородины обычно плохо проветриваются, солнце почти не касается внутренних ветвей – это ли не благодать для вредителей и болезней?! Но шансов быть здоровой у смородины значительно больше, если она растет на шпалере. А участок при этом получает еще и настоящую ягодную стену

Ягоды веером крупнее, сочнее

Оговоримся сразу, здоровье и красота сада требует внимания и заботы, а шпалеры – не из разряда «посадил и забыл». Но усилия того стоят – ягоды на шпалерах вырастают крупнее, а урожай бывает в 1,5–2 раза больше, чем на обычных кустах.

Итак, по порядку. Вначале выбираем место. Живую стену можно возвести по периметру сада – заодно красиво огородиться от соседей. Ею легко отделить огород от зоны отдыха – у детей появится уголок для игры в прятки. Если шпалеры поставить вдоль дорожек, то по такой аллейке приятно пройтись, заодно вкушая витаминные ягоды.

Длина шпалеры может быть любой. Если есть желание поставить два ряда шпалер, тогда между ними расстояние должно быть не менее 1,5 м. Иначе кустам не будет хватать солнца. Как показывает практика, на шпалерах прекрасно чувствует себя любая смородина. На плоской «стене» просматриваются практически все ягоды, хоть бери кисть и рисуй. Глаз не оторвать от ярких, сочных гроздей красной, соблазнительно висящих на фоне зеленых листьев. Янтарем горят прозрачные бусинки золотистой и белой. Очень живописны крупные глянцевые ягоды черной смородины. Но с ней есть свои нюансы, о которых скажем ниже.

ПОДХОДЯЩИЕ СОРТА

* Ровада, Дана, Ролан, Лентяй, Сибилла, Севчанка, Селеченская 2 и другие.


* Для выращивания на шпалерах лучше подходят зимостойкие, устойчивые к болезням сорта. Живая стена будет тем выше, чем более высокорослый сорт будет посажен.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ


Для посадки роем траншею глубиной примерно 15–20 см, шириной 10–15 см. Добавляем органику плюс немного минеральных удобрений, например, нитроаммофоски (50 г на 1 погонный метр).

Засыпаем землей, хорошо перемешиваем и немного уплотняем. Укрываем полоску траншеи черным лутрасилом или черной пленкой. На материале через 20–30 см делаем надрезы крест-накрест, вставляем черенки, углубляя на 5–7 см, чтобы укоренились. Здесь не помешает аккуратность – от того, насколько прямым получится ряд, зависит и ровность будущей стены.


ВЫРАЩИВАНИЕ СМОРОДИНЫ НА ШПАЛЕРЕ




1 Начало формирования



2 Второй год



3 Третий год



4 Четвертый и последующие годы

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

ШПАГАТ (ИЛИ ОЦИНКОВАННАЯ, БЕЗ РЖАВЧИНЫ ПРОВОЛОКА) ДОЛЖЕН БЫТЬ НАТЯНУТ СИЛЬНО, КАК СТРУНА, И НЕ ДОЛЖЕН ПРОГИБАТЬСЯ. ВЕТВИ НЕ ЗАЖИМАТЬ!

После посадки растения пролить раствором «Корневина». Летом – обычный уход, черенки должны вырасти на 50–70 см.

На следующий год рядом с траншеей готовим шпалеры. Через каждые 2 м ставим трубы высотой около 1,5–2 м, устойчиво забиваем их в землю. Нижние концы труб для защиты от гниения нужно обмазать гудроном или обработать антисептиком. Опоры будут устойчивее, если их ставить под углом около 20° с наклоном к внешним концам ряда.

Теперь натягиваем несколько рядов шпагата или проволоки – через каждые 30–50 см, к которым осторожно привязываем ветви смородины.

Формировка ветвей

Растения на следующий год уже дадут ветви, из них оставляем 3–4 наиболее крепких побега, остальные удаляем. И подвязываем к проволоке. Также для ветвей можно поставить опоры – любые палки.

Ягоды на шпалерах вырастают куда крупнее обычных, а урожай бывает в 1,5–2 раза больше, чем на обычных кустах

Таким образом, красная, белая смородина сможет плодоносить 8–10 лет, а черная – 2–3 года, дальше ее нужно омолаживать – ягоды начнут мельчать, кусты придется заменить. Но то же самое происходит не только со шпалерными ягодниками, но и с обычными кустами.

ЗА...

Шпалеры занимают меньше места. Кусты хорошо освещаются, проветриваются со всех сторон, значит, бывает меньше вредителей. Есть условия для лучшего опыления и, соответственно, завязывания плодов. Удобно собирать ягоду, она крупная, чистая

+

–

Требует больше времени для ухода. Нужно подвязывать ветви, проводить обрезку

...ПРОТИВ

ВЕЕРНЫЙ СПОСОБ

Для веерного расположения кустов так же роем траншею, удобряем, накрываем лутрасилом. Но черенки сажаем через 80–100 см. В дальнейшем растущим побегам придаем положение веером и в таком виде подвязываем к шпалере. Их можно также привязывать к бамбуковым или другим палкам, которые следует расположить в виде лучей.


Формировка ветвей

В течение последующих лет вырезаем все новые ветки, оставляя лишь 5–7 основных. Веерный способ дает больше преимуществ – черная смородина, например, без омоложения куста будет плодоносить 4–5 лет.

Побеги, «выглядывающие» из плоскости стены в стороны, желательно вырезать.

Валерий Семенов, к. с.-х. н.





НАШ ЭКСПЕРТ:
Татьяна СЕМЕНОВА,
к. с.-х. н.



? После сбора смородины сразу обрезал на кустах старые ветки. Замазал срезы варом. Не рано ли я это сделал? Если навредил, то чем помочь растениям подготовиться к зиме?

Николай Приречный, г. Тула

■ По первому вопросу – вы все сделали правильно. После обрезки все питательные вещества хлынули к оставшимся веткам, в результате смородина успеет хорошо вызреть. В принципе, нет особой разницы в том, когда сделаете обрезку – осенью или после сбора урожая.

? Соседи по даче мне дали кусты малины, осенью посадил. Летом был небольшой урожай. Что мне делать осенью – обрезать все ветки или несколько оставить? Как определить, что обрезать?

Валентин Сергеев, г. Талдом

■ Ветки малины вырезают после того, как она отплодоносит. Убирают те побеги, которые давали плоды, другие оставляют. Чем ниже отрезать побег, тем лучше. У взрослого куста обычно сохраняют 2–3 сильных побега, но у вас молодой куст, так что можно оставить все не плодоносившие ветки. После обрезки куст нужно подкормить комплексным удобрением и полить. Если будет сухо, растение нужно периодически поливать.

? Осенью положила мульчу из лесного опада под малину. Надо ли весной его убирать? Или оставить – пусть преет?

Оксана Иверина, г. Омск

■ Весной не стоит тормошить мульчу под малиной, пусть лесной опад лежит и дальше. Ведь под ним уже построили свои домики миллионы живых существ и организовали пищевые цепочки, не надо портить их сообщества.


ГАЗЕТА ДАЧА

СЕГОДНЯ ЕЩЕ НУЖНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ!

- Натуральная полезная еда прямо с грядки



- Выгодное вложение денег



- Прекрасный отдых с семьей на природе








Газета «ДАЧА pressa.ru» выходит 2 раза в месяц. Подписной индекс в каталоге «Почта России» **П2940**

Реклама 12+

Свой черенок не подведет



Первое, что должен освоить садовод, – это получение своего посадочного материала. Тогда и сорт будет тот, который вы хотите, и его качество станет соответствовать вашим запросам. Да и сад легче обновить и приумножить. В этом плане у опытных садоводов практики достаточно, но, как говорят, повторение – мать учения. А для начинающих дачников – урок

Посадить у себя именно тот сорт черной или красной смородины, о котором мечтается, задача непростая, особенно для начинающего садовода. Необходимые саженцы найти трудно, хотя рынок и изобилует посадочным материалом. Но кто даст гарантию, что вы покупаете именно тот сорт, за который его выдает продавец?

Но коль вы уже заполучили желаемую смородину или приметили ее у соседа, куст легко размножить. А значит, сохранить. Есть два простых способа, которые дают гарантированный результат.

ВЫИГРАЕМ ЦЕЛЫЙ ГОД

✻ Если прищипнуть молодые побеги черенка смородины под 4–5 листом, то из пазух листа к осени отрастет по 4–5 новых побегов. Этим приемом можно выиграть целый год: сажать не двухлетние саженцы, а однолетние. На кустике получится 8–10 веточек. Заглубите их в землю при посадке и оставьте по 3–4 почки – на второй год куст будет уже сформирован.

Размножение отводками

Размножение отводками – самый эффективный способ. Весной, после внесения органики, выбираем здоровый куст, а на нем – сильный однолетний побег. Его нам нужно будет прикопать, для чего выкапываем канавку глубиной 8–10 см и длиной, равной выбранной ветке.

Лучшее время заготовки одревеснивших черенков смородины в средней полосе – сентябрь. Но и при посадке в октябре они приживаются без проблем

Ветвь укладываем в канавку и пришпиливаем таким образом, чтобы она плотно лежала на дне. Прищипываем кончик ветки до первой почки, – это стимулирует рост вертикальных побегов: их ко-

личество будет равно количеству почек на ветке.

Со временем в канавке появятся вертикальные побеги смородины. Когда они достигнут высоты 10–12 см, канавку присыпаем рыхлой и влажной почвой. В дальнейшем стараемся поддерживать влажность почвы, периодически рыхлим.

Во второй половине сентября пригнутую ветвь от куста отрезаем секатором и выкапываем. Важно не повредить корни! Затем разрезаем на столько частей, сколько есть побегов или отдельных кустиков на ветви.

Таком способом с одной ветви можно получить от 8 до 15 саженцев. Есть что посадить или поделиться со знакомыми, а то и немного заработать.

Размножение черенками

Лучшее время заготовки одревеснивших черенков смородины в средней полосе – сентябрь. Но и при посадке в октябре они приживаются без проблем.

Срезаем сильные однолетние ветви и нарезаем из них отрезки длиной 15–20 см с 5–6 почками. Верхушки побегов также можно использовать – они хорошо укореняются, поэтому, если однолетних побегов мало, а предстоит вырезка, на черенки можно брать и прирост текущего года.

Высаживать черенки нужно сразу же после их заготовки. Если предстоит перевозка, то важно затормозить испарение влаги с кончиков черенков, для этого помещаем их в полиэтиленовый пакет или надежно оборачиваем пленкой, сгодится и влажная ткань.

К СЛОВУ

✻ Уже стало садовой аксиомой – саженцы и черенки нужно приобретать в проверенных питомниках, у хорошо знакомых садоводов или непосредственно на участке более опытного садовода – в этих случаях ошибки сводятся к минимуму.

Почва при посадке должна быть плодородной и рыхлой, с органикой, то есть такой же, как и под маточными растениями.

Сажаем черенки наклонно, под углом 45°. Наклон должен быть обращен к югу. Черенки заглубляем так, чтобы над поверхностью почвы оставалось две почки.

Схема посадки: 10–12 см между черенками и 30 см между рядами.

Юрий Ушаков

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ БЫСТРОГО УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ – ПОСТОЯННАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ. ПОСЛЕ ПОЛИВОВ И ДОЖДЕЙ ВАЖНО РЫХЛИТЬ ПОЧВУ, ЧТОБЫ ВЛАГА НЕ ИСПАРЯЛАСЬ И К РАСТУЩИМ КОРНЯМ ПОСТУПАЛ ВОЗДУХ. И, КОНЕЧНО, УДАЛЯТЬ СОРНЯКИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ОТНИМАЮТ НЕ ТОЛЬКО ВЛАГУ, НО И ПИТАНИЕ.

ДОМАШНИЙ ПОВАР. СПЕЦВЫПУСК. КОНСЕРВИРОВАНИЕ



12+ Реклама

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ!

В нашей серии «Домашний повар» выходит новый спецпроект «КОНСЕРВИРОВАНИЕ». Для любителей сохранять дары лета на зиму мы составили сборники рецептов по темам: «Огурцы», «Помидоры», «Перец», «Кабачки, баклажаны и патиссоны», «Капуста».

В каждом журнале рецепты подобраны по способу консервирования: маринования, соления, квашения. Добавлены варианты заморозки, приготовлению варений и джемов из овощей, заправок для первых блюд. Консервированные овощи делают нашу пищу богаче и разнообразнее, становятся отличной добавкой к мясным и рыбным блюдам, картофельному пюре, рису или макаронам, могут стать основой рагу или начинкой для пиццы. А наиболее понравившиеся заготовки могут украсить и праздничный стол, например, – вяленные помидоры, лечо или кабачковая или баклажанная икра, соусы и аджики.

По традиции в состав кулинарных сборников мы включили рецепты не только из архива редакции, но и из присланных нашими дорогими читателями своих любимых блюд. Причем кроме оригинальных рецептов добавили простые, которые можно приготовить из продуктов, купленных в ближайшем супермаркете, рынке или выращенных на дачном участке.

В сборниках немало полезных советов, времени приготовления заготовок и для каждого рецепта указано количество и объем нужных для консервированных овощей посуды.

К выпуску готовятся сборники «Новогодний стол». В этой серии выйдут журналы с подбором рецептов салатов, закусок, горячего, десертов и выпечки.

ЖУРНАЛЫ В ПРОДАЖЕ С 17 ИЮЛЯ. СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

НАШ ЭКСПЕРТ:
Татьяна СЕМЕНОВА,
к. с.-х. н.



? В мае посадил ремонтантную малину (все делал по правилам), везде пишут, что ягоды она даст в год посадки. Но не цвела, и завязей нет. Ветки большие, зеленые. Саженцы покупал в надежном магазине. На них была видна прививка, выше нее два ростка. Сорт вызывает доверие. Что сделать, чтобы был урожай в этом году и в следующем тоже?

Иннокентий Калугин, г. Москва

■ Малину никто никогда не прививает, она размножается отпрысками от корней. Если вам действительно продали ремонтантный сорт – она зацветет в середине августа. Если же зацветет весной и даст плоды, то вам продали не ремонтантную. В августе ее не нужно дополнительно подкармливать, но если слишком сухо, нужно поливать. Малина любит влагу. Ни в коем случае не прищипывайте. Малину ремонтантную надо осенью обрезать под корень, весной она даст побеги, они зацветут в августе-сентябре и порадуют плодами. А пока подождите – в первый год она начинает цвести поздно.

? Друзья-садоводы осенью заделывают удобрения не просто в почву, а копают канавки вокруг смородины, малины (глубиной около 20 см) и насыпают их туда. Но копка на такой глубине разве не повреждает корни? Хотела бы сделать так же, но решила уточнить. На каком расстоянии от ствола и на какую глубину копать траншеи? И что лучше вносить осенью?

Елена Боева, г. Истра

■ Есть другой, более щадящий для корневой системы способ. Ломиком сделать дырочки по периметру кустов на глубину 15–20 см и чайной ложкой насыпать туда удобрения. В октябре можно одну мочевину, она уже растение не разбудит. А весной лучше комплексные, обязательно гранулированные (они корни не обжигают) – для каждого растения в продаже есть свои наборы. И вносить по инструкции на пакете.

ЗАЩИТА



- Как защитить урожай
- Смородина на грани исчезновения?
- Правила обработки

Как защитить урожай ягод

Малина и смородина являются настоящим магнитом не только для нас, но и, к сожалению, для целой армии садовых вредителей и болезней. Чтобы собрать отменный урожай, от дачника потребуется повышенное внимание и применение различных мер защиты растений

БОЛЕЗНИ ЯГОДНИКОВ

Антракноз

Какие культуры поражает

Малина, смородина (чаще поражает красную)

Возбудитель болезни.

Антракноз малины вызывает гриб *Elsinoe veneta*, смородины – *Colletotrichum orbiculare*. Возбудитель зимует в опавшей листве. Быстро распространяется за счет ветра и насекомых. Оптимальные условия для развития возбудителя заболевания – высокая влажность и умеренная температура воздуха.



Симптомы. В первой половине июня на листьях образуются мелкие красноватые или бурые пятна диаметром около 1 мм. При сильном поражении пятна сливаются, покрывая почти всю листовую пластинку, листья скручиваются краями вверх и опадают. Нижняя часть побегов постепенно оголяется. На оголенных побегах трогаются в рост пазушные почки, новые слабые побеги плохо переносят зиму, урожай снижается. На побегах, черешках, плодоножках образуются небольшие вытянутые бурые язвочки.

Меры защиты. До цветения и после него кусты и почву под ними опрыскивают настоем золы,

1%-ным раствором бордоской смеси. Для лечения пораженные кусты опрыскивают 3%-ным раствором бордоской смеси или сульфата меди (первый раз – при обнаружении заболеваний, второй – после сбора урожая). Почву вокруг пораженных кустов обрабатывают раствором препаратов «Абига-Пик», «Оксихом», «Превикур», «Ордан», «Хомецин», «Хом», разведенных согласно инструкции.

Осенью почву перекапывают, заделывая в нее опавшие листья. Новые кусты не сажают на том месте, где были высажены пораженные кусты малины или смородины.

Устойчивые сорта:

- **смородины:** Лентяй, Селеченская, Орловский вальс, Ядреная, Оджебин, Орловия, Пигмей, Минай Шмырев;
- **малины:** Гордость России, Пересвет, Бенефис, Гусар, Метеор, Октавия.

Мучнистая роса

Какие растения поражает

Малина, смородина

Возбудитель

На смородине и малине – гриб *Sphaerotheca mors-uvae*. Зимуют на верхушках побегов, неопавших листьях и опавших ягодах. Споры легко разносятся ветром, насекомыми, дождем, заражая в течение всего лета новые растения.

Симптомы. Страдают молодые части растений: черешки, листья, побеги. Весной на листьях появляется белый рыхлый налет, состоящий из спор гриба. При сильном развитии заболевания лист с обеих сторон покрывается сплошным войлоком белой грибницы. Пораженные части растений подсыхают, листья становятся гофрированными, мелкими, междоузлия побегов укороченными. Сильно пораженные листья опадают.





Меры защиты. Осенью удаляют и сжигают поврежденные верхушки. Почву под кустами перекапывают, заделывая опавшие листья. Выращивают устойчивые к мучнистой росе сорта. Рано весной до распускания почек орошают кусты горячей водой (60–65 °С). Обрабатывают растения и почву под ними до и после цветения, сразу после сбора урожая настоем золы (3 кг на ведро воды), кальцинированной содой с мылом (50 г соды + 50 г мыла на ведро воды), мыльно-медной эмульсией (150 г мыла + 20 г медного купороса на ведро воды).

Устойчивые сорта:

- **смородины:** Дар Смольяниновой, Добрый Джинн, Дочка, Лентяй, Орловия, Орловская серенада, Память Бардова, Черноокая;
- **малины:** Галочка, Ипуть, Овстуженка, Орловская янтарная, ТСХА-3, Тютчевка.

Септориоз

Какие растения поражаются
Смородина, малина

Возбудитель

На смородине – гриб *Septoria ribis*, на малине – гриб *Mycosphaerella rubi*. Другое название – белая пятнистость. Зимует в опавших пораженных листьях.

Симптомы. Поражаются листья, побеги, иногда ягоды. В начале июня на листьях появляются мелкие коричневые пятна (на смородине) и светло-бурые с темным ободком (на малине), диаметром 2–3 мм, постепенно белеющие, с мелкими точечными черными пикнидами в центре. В августе септориоз может вызвать массовое опадание листьев, зараженные побеги плохо вызревают. Урожай будущего года снижается в 2–3 раза.

Меры защиты. Те же, что и с антракнозом.

Устойчивые сорта:

- **смородины:** Дар Смольяниновой, Дачница, Илья Муромец, Искушение, Купалинка, Лентяй, Орловская серенада, Очарование, Памяти Павловой (Бинар), Селеченская, Титания, Цецера;
- **малины:** Беглянка, Днепр, Журавлик, Метеор, Новость Кузьмина.

Вертициллезное увядание малины

Какие растения поражает
Малина

Возбудитель

Опасное вирусное заболевание, которое быстро приводит к



гибели растения, возбудитель – *Verticillium albo-atrum*.

Симптомы. У пораженных растений начинают увядать верхушки побегов, усыхают листья, сначала у самой земли, затем и выше по побегу. На коре появляются сизые или лиловые пятна, постепенно они сливаются в полоски. Кора трескается. Побеги и корни постепенно усыхают.

Меры защиты. Это вирусное заболевание очень вредоносно. Эффективных мер борьбы с ним не существует. Но при подозрении на увядание кусты начинают опрыскивать препаратами «Витарос», «Превикур», «Триходермин», разведенными согласно инструкции. Пораженные кусты удаляют. Рядом с малиной не высаживают картофель, томаты, землянику. Соблюдают севооборот.

Устойчивые сорта: сортов, устойчивых к вертициллезному увяданию, пока не выведено.

ВРЕДИТЕЛИ ЯГОДНИКОВ

Смородинный почковый клещ

Какие растения поражаются
Смородина черная

Вредитель
Насекомые – *Cecidophyopsis ribis*, не заметные глазу четырехногие клещи. Зимуют самки клеща внутри почек. В течение месяца с начала цветения клещи расползаются по побегам, с помощью ветра, дождя, птиц попадают на ближайшие кусты и заселяют пазушные почки молодых листьев.

Симптомы. Пострадавшие почки уже осенью можно обнаружить по округлой и несколько увеличенной форме. В период



цветения смородины в одной почке накапливается до 8 тыс. штук клещей разного возраста. Почка сильно увеличивается в размере, достигая диаметром 1 см. Зараженная почка не распускается, но слегка раздвигающиеся чешуйки дают возможность клещам выползать наружу. После того как клещи покинут почку, она засыхает на побеге.

Меры борьбы. До начала распускания почек кусты 2–3 раза осматривают, удаляя и уничтожая зараженные почки или побеги. Лучший срок борьбы с почковым клещом – период их миграции, от начала распускания почек до цветения. В это время применяют препараты «Контос», «Энвидор», «Ниссоран», «Оберон», используют настои табака, махорки, одуванчика, чеснока.

Тля

Какие растения поражаются

Смородина, малина

Вредитель

На смородине – листовая галловая тля (мелкое, желто-зеленое, бескрылое насекомое), на малине – малинная побеговая (маленькое, светло-зеленое насекомое, покрыто восковым налетом, образует многочисленные колонии) и малинная листовая тля (небольшое, темно-серое насекомое, живет на внутренней стороне листьев по одной особи или небольшими группами).

Симптомы. Листовая галловая тля появляется в момент распускания листьев. На нижней стороне молодых листьев смородины



образуются колонии тлей, которые высасывают сок из растений. Листовая пластинка в местах питания тлей разрастается, образуются хорошо заметные вздутия (галлы). Поверхность листа приобретает темно-красную окраску. Листья засыхают и опадают, прирост побегов и урожайность снижаются.

Малинная побеговая и листовая тля появляется в первой половине лета. У пораженных кустов начинают скручиваться и усыхать листья, опадают бутоны, молодые побеги медленнее развиваются, ягоды деформируются и опадают.

Меры борьбы. При поражении после сбора урожая все кусты опрыскивают препаратами «Алатар», «Искра-М», «Фуфанон» или «Актеллик», разведенными согласно инструкции. Весной следующего года до появления бутонов обработки повторяют, используя эти же препараты.

Малинная стеблевая галлица

Какие растения поражаются
Малина

Вредитель
Насекомые – *Resseliella theobaldi*, мелкие, темные, крылатые, откладывают яйца в повреждения или естественные трещины на побегах. Зимуют в виде куколок в почве.

Симптомы. Галлица вызывает на побегах хорошо заметные вздутия, которые также называются галлами. Через повреждения, вызываемые галлицей, могут проникать споры дидимеллы. Галлы препятствуют перемещению питательных веществ, что приводит к гибели почек и отмиранию листьев.

Меры борьбы. Поврежденные побеги вырезают. Весной, до начала распускания листьев, кусты обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса или бордоской смеси. В период формирования бутонов и после сбора урожая кусты обрабатывают препаратами «Алатар», «Искра-М», «Фуфанон» или «Актеллик».

Крыжовниковая огневка

Какие растения поражаются
Смородина

Вредитель
Насекомые – *Rhynchites auratus*. Маленькая серая бабочка, до 3,6 см.

Симптомы. На листьях и побегах появляется тонкая паутина.



Поврежденные ягоды покрываются паутиной, раньше времени окрашиваются, загнивают, засыхают и остаются висеть на ветке до конца сбора урожая.

Меры борьбы. Необходима высокая агротехника культуры. Осенью перекапывают и мульчируют почву под кустами. Собирают оплетенные паутиной ягоды вместе с гусеницами и уничтожают.

Цветоед малинный

Какие растения поражаются
Малина

Вредитель
Насекомые – *Anthonomus rubi*. Жук черного цвета, с серыми щетинками, голова вытянута в хоботок. Личинки безногие, белые, голова желтовато-коричневая. Зимуют в земле, под опавшими листьями или растительными остатками.

Симптомы. На листьях появляются мелкие дырочки. Опадают соцветия, цветоножки могут быть подгрызены и бутоны на них повисают. Если взять бутон, то внутри можно обнаружить или маленькое яйцо, или уже появившуюся личинку.

Меры борьбы. Малину сажают вдали от садовой земляники, так как в первую очередь вредитель нападает на нее, а затем уже переходит на малину. Собирают опавшие бутоны. При массовом поражении используют химию. До раскрытия цветков обрабатывают кусты препаратами «Алатар», «Искра-М», «Фуфанон», «Таран», «Искра-Био», «Энтонем», «Немабакт», разведенными согласно инструкции.











ЖУРНАЛ В ПРОДАЖЕ С 3 ИЮЛЯ! СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ, СУПЕРМАРКЕТАХ И ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

Реклама

ЗАКАЗЫВАЙТЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА НА САЙТАХ:

ozon.ru

wildberries.ru

На сайте маркетплейса наберите в поисковой строке полное наименование: Издательская группа КАРДОС

ООО «Издательская группа «КАРДОС». ОГРН: 1103254015270. Юр. адрес: РФ, 111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, офис 4

НАШ ЭКСПЕРТ:
Павел ТРАННУА,
ученый агроном



Есть три куста смородины, 4-летние, плодоносят нормально. Но листья подозрительно светлее, чем у кустов старых сортов. Чего-то не хватает растению или, может быть, это особенность сорта? Думал, хлороз, внес под один куст железный купорос с лимонной кислотой. Не сработало. Сидят возле теплицы, солнца им хватает.

Владимир, г. Апрелевка

Посветление листьев могут вызвать многие причины, поэтому пригодились бы еще уточнения: со дня посадки такое наблюдалось или недавно появилось? У всего куста целиком такой оттенок или у отдельных листьев? Чем удобряли кусты?

Одно можно сказать точно: раз владелец принял признаки за хлороз, значит, оттенок желтоватый, и это не мучнистая роса (она белая).

Обычно определяют методом исключения: если поражены отдельные листья, а не весь куст, скорее всего, причина – вредители, а не болезнь. Это проще, часто можно вообще не беспокоиться, какой-нибудь локальный сосальщик потом сам уйдет.

Если же поражен весь куст, то это либо болезнь, либо отравление растения. Раз плодоношение есть, значит, это не вирусная болезнь, уже хорошо. По крайней мере, здесь нет и какого-то сильного отравления.

Еще всегда нужно смотреть на зеленые приросты текущего года: если они нормальные на ветках (по 15–20 и более см), а в центре куста есть и более длинные зеленые побеги, то куст, в целом, здоров.

Так что я бы здесь просто дал нормальное питание: черная смородина любит азот, а

его дефицит как раз дает посветление листвы. Но в чистом виде (карбамидом) азот давать ей нельзя, так что разложите кольцом вокруг кустов либо просто прелую траву (прошлогоднюю или недавно накошенную), либо компост, либо прелый навоз. Сорняки подрубайте вместе с этим покрытием, такая процедура перемешает его с землей. А дождевые черви затянут его глубже.

НА БУДУЩЕЕ

❊ В средней полосе вообще можно забыть про тему хлороза, так как здесь в почвах полно железа. Как могут на наших почвах вырастать огромные дубы, если железо недоступно? Ни одна травинка не вырастет без железа в почве. Также лить кислоту под садовые растения на наших кислых почвах – это тоже из разряда «форумной игры в ученых».





Черная смородина на грани исчезновения?

Навещая знакомых садоводов, заметил, что у многих уже не растет черная смородина. И как тут не вспомнить те времена, когда нас, детей, в наказание за провинности загоняли в сад на целый день – собирать ягоды. Обсыпные кусты, казалось, нам вовек не обобрать. Так что же случилось?

Одной из причин, полагаю, стало глобальное изменение климата. Не новость, что за последние лет 15–20 на планете стало значительно жарче. А черная смородина – культура умеренного климата. Она не то что засуху не выносит, но нередко погибает от солнца даже при регулярном поливе. Что неудивительно – ведь температура на поверхности почвы в летний солнцепек достигает 50–60 °С. А для нормального роста смородины нужно не более 30 °С на грунте.

Добивают жара и болезни

Но дело не только в самом потеплении. Есть тут и сопутствующая проблема – в жаркое лето черную смородину, ослабленную неблагоприятными условиями, добивают грибные заболевания: фузариозный и вертициллезный вилт (от английского – вянуть). Многие садоводы жалуются, что здоровые с виду кусты усыхают буквально на глазах, за несколько дней. Хоть и явных признаков заболевания не видно. И погибают они не только



Смородина, пораженная вилтом

быстро, но и полностью, не давая шансов спасти растения.

Мой печальный опыт

В том, что в последние лет десять черная смородина буквально находится на грани исчезновения, я убедился на личном опыте. Приобрел в питомнике пару десятков различных сортов. С энтузиазмом отвел им самое просторное, солнечное место на участке. С весны

СОРТА ДЛЯ ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНОВ

Если в вашей местности преобладают периоды засухи, обратите внимание на засухоустойчивые сорта: Юбилейная Копаня, Подарок Калининой, Мрия-5, Вернисаж, Ирмень, Чернавка, Владимирская, Тамерлан, Бен Ломонд, Оджебин и другие. Но и эти сорта желательно притенять.

обильно поливал и подкармливал. В ответ кусты радовали мощным приростом.

Но вот начался жаркий июль. На листьях и вершинах побегов стали появляться беловато-бурые пятна от температурных ожогов (на фото), листья загибались и оставались висеть на кустах сухими. Через короткое время растения стали выглядеть, как гербарий.

Выжили только хилые

Первыми, в течение месяца, погибли не замульчированные кусты. Что объясняю перегревом грунта. Но к осени погибла и половина кустов на мульчированном рядке.

В следующем году ситуация повторилась, и в итоге не осталось ни одной смородины. Кроме нескольких хилых кустов, которые в питомнике мне бросили на добавку, и я, чтобы не отнимать ценную площадь, высадил их в саду под деревом. Вот они-то росли нормально и плодоносили. Но я тогда еще не понимал ситуацию. И решил спилить ставшее ненужным дерево, под пологом которого они росли. А через год кусты погибли – от жары и сопутствующего поражения вилтом.

Для полноты картины отмечу, что как раз те годы, когда у меня выгорела вся смородина, выдались очень знойными и с редкими дождями.

Делаем выводы

Вывод напрашивается сам собой: нужно высаживать смородину там, где кроны деревьев защитят ее от палящего солнца. Подойдут и кулисы из высокорослой кукурузы. Либо надо делать над ней укрытие из притеняющей сетки – так ее растят в ряде питомников.

Почву надо обязательно мульчировать слоем 15–20 см. Бросать под кусты выполотую траву, листья, картон... И все время что-то подсыпать, когда мульча осядет. Все это снизит негативное влияние жары и повысит сопротивляемость смородины к вилту.

Средства от инфекции

Если же инфекция продолжает развиваться, следует полить растения под корень раствором одного из фунгицидов, например: «Топсин-М», «Бенлат», «Превикур», «Витарос», «Фундазол» (по инструкции). Обратите внимание, чтобы приобретенный фунгицид был предназначен для внесения в почву, а не для опрыскивания.

Денис Терентьев, агроном, физиолог растений, Ростовская обл.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

БЕЗ ПРИТЕНЕНИЯ И ОРОШЕНИЯ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ ВЫРАЩИВАНИЕ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ СИЛЬНО ЗАТРУДНЕНО. ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ ЗДЕСЬ СМОРОДИНУ КРАСНУЮ И ЗОЛОТИСТУЮ – ОНИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫ И НЕ БОЯТСЯ ЖАРЫ.

НАШ ЭКСПЕРТ:
Татьяна СЕМЕНОВА,
к. с.-х. н.



На участке растут 6 кустов смородины. На 4 из них урожай собираем очень хороший, а пару кустов не дают ничего. Уход за всеми одинаковый. Почему растения совсем не плодоносят?

Надежда Пошехонская, г. Клин

При одинаковом уходе отсутствие плодоношения у некоторых кустов смородины может быть связано с их сортовыми особенностями и сроками цветения. Сильнее всего цветки и молодые завязи повреждают весенние заморозки. В это время кусты необходимо укрывать. Завязываемость ягод снижается в холодную и ветреную погоду из-за плохого лёта насекомых-опылителей. Жаркая и сухая погода сокращает период опыления цветков. Необходимо подбирать самоплодные сорта, сажать кусты в защищенных от ветра местах, в жаркую погоду увлажнять почву и воздух, привлекать шмелей и пчел. Но, самое главное, на участке должны быть сорта с разными сроками цветения и плодоношения.

Кроме того, причиной отсутствия урожая может быть опасное микоплазменное заболевание – реверсия (махровость) смородины. Признаки махровости легко обнаружить во время цветения. Цветки у больных кустов имеют ненормально узкие лепестки, чаще всего фиолетовой окраски, пестики сильно разрастаются. Цветочная кисть похожа на тонкую зеленую веточку с чешуйками вместо ягод. Листья вместо обычных пятилопастных становятся трехлопастными и вытянутыми, кусты сильно загущаются.

Лечению это заболевание не поддается, поэтому важно своевременно выявить больные кусты, выкорчевать их с корнями и сжечь.



Правила обработки ягодников

Для весенней борьбы с вредителями и болезнями растений существует целый арсенал препаратов. Однако у каждого из них прописан оптимальный «час приема», совместимости с другими лекарствами. Поторопишься или намешаешь – только навредишь

Химическая борьба с вредителями и возбудителями болезней растений требует знаний, навыков, умения. Некоторые растения (например, томаты) очень чувствительны к пестицидам, поэтому действие каждого препарата проверяют на небольшом количестве растений. Необходимо правильно выбирать и время проведения обработок: весной – рано утром, летом и ранней осенью – вечером, желательно всегда в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев.

Какой препарат выбрать

- **«Актеллик».** Нельзя смешивать с бордоской смесью и иными щелочными препаратами.
- **«Фитоверм».** Нельзя смешивать с другими препаратами.
- **«Фуфанон».** Препарат эффективен в течение 5–10 дней, однако смывается дождями. Не рекомендуется опрыскивать растения во время цветения, а также смешивать эмульсию с иными препаратами. Инсектицид вреден для пчел.

«Кинмикс». Препарат опасен для пчел и рыб. Поэтому если у вас на садовом участке есть личная пасека или водоем с декоративными рыбками, лучше воздержаться от применения данного инсектицида.

«Абига-Пик». Это медьсодержащий препарат, поэтому работать с ним можно только в пластмассовой, стеклянной или эмалированной таре во избежание реакции окиси меди с металлом.

«Хорус». Действующее вещество плохо проникает внутрь зрелых листьев. Поэтому препарат может дать максимальный эффект при обработке молодых растений в начале вегетационного периода.

«Тиовит Джет». Нельзя смешивать с препаратами, имеющими щелочной тип реакции и масло в основе.

Принцип действия

Различают два параметра – срок защиты растения и период ожидания.

Срок защиты – период, в течение которого растение без повторных обработок находится под защитой препарата. В среднем они чувствуют себя защищенными около двух недель, после этого, если угроза заражения еще существует, обработку следует повторить. Этот срок распространяется на такие препараты, как бордоская смесь, «Абига Пик», «Хом», «Скор» и другие.

Однако у некоторых препаратов срок защиты приближается к месяцу и дольше. Например, «Актара», «Топсин-М», «Карате», и другие.

Срок ожидания – промежуток от последней обработки пестицидами и уборкой урожая. Для многих биопрепаратов такой срок порою отсутствует вообще. К примеру, биопестицид «Фитоверм» имеет срок ожидания 3 дня. Для химических препаратов срок ожидания может составлять до 20–24 дней, («Фуфанон», «Инта-Вир», «Скор», «Хом», «Абига-Пик», «Раек»). У бордоской жидкости – 38 дней. Эти параметры указаны в инструкции к препарату.

Правила безопасности

Если после обработки растений прошел дождь, ее необходимо повторить, так как пестициды легко смываются водой. Надо следить за тем, чтобы раствором смачивалось все растение.

При работе с пестицидами необходимо использовать респиратор или защитные очки и ватно-марлевую повязку, закрывающую рот.

Работая с химическими препаратами, необходимо следить, чтобы раствор не попадал на руки и лицо. Нельзя при этом курить, пить и есть. После окончания работ тщательно моют руки и лицо с мылом.

Хранят пестициды в закрытой посуде, на которой указывают название препарата, растворы – в специальной посуде, которую нельзя использовать для других целей.

Анна Романова

Коротко о важном

Созревание ягод можно ускорить, стимулируя рост, раскладывая в приствольные круги пленку или нетканый материал черного цвета, чтобы укрывной материал быстрее нагревался сам и прогревал почву вокруг растений.

Смородину и малину поливают часто, но умеренно. Для этих ягодных кустарников вредно как чрезмерное увлажнение, так и засуха.

Сразу после плодоношения и далее до зимы у малины обыкновенной удаляют отплодоносившие ветки, слабые тонкие однолетние побеги небольшой высоты. А также больные ветки. Срезы делают на уровне почвы. На кустах оставляют от 3 до 5 побегов.

Смородину начинают обрезать в начале осыпания листьев. Удаляют все слабые, загущающие куст или сильно поникшие к земле ветви. А также поломанные и поврежденные вредителями и болезнями.

Если посадочные ямы были хорошо заправлены удобрениями, то первые три года фосфор и калий под смородину не вносят. Но начиная со второго года подкармливают азотом, а в дальнейшем и другими элементами.

Перед весенней подкормкой ягодников нужно очистить приствольные круги от старых листьев и верхнего слоя мульчи – в них могут быть очаги болезней и вредителей.

Для ягодников удобно использовать комплексные минеральные и биоудобрения, рассчитанные по фазам развития: весна – лето – осень. А также жидкие удобрения (по инструкции).

После весеннего внесения удобрений почву вокруг кустов мульчируют любой органикой слоем не менее 10 см. Мульчирование – это хороший помощник садовода. Почва под таким укрытием не перегревается и не переохлаждается, сорнякирастут гораздо медленнее. Кроме того, перепревая, она отдает в почву органику, пусть и в небольшом количестве.

Созревание ягод можно ускорить, стимулируя рост, раскладывая в приствольные круги пленку или нетканый материал черного цвета, чтобы укрывной материал быстрее нагревался сам и прогревал почву вокруг растений.

БЕЛОРУССКАЯ БРИГАДА

Пенсионерам и инвалидам скидка 15%



РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ:

плитка, штукатурка, обои, евроремонт

- Строительство домов
- Снос старых домов
- Вывоз мусора
- Подъём домов
- Сайдинг
- Замена кровли, лаг, полов, крыш
- Установка фундамента
- Монтаж забора, хозблоков и пристроек

Реклама

8 (920) 009-00-86 НИКОЛАЙ • **8 (963) 676-41-92** ДМИТРИЙ



ООО «МКВИК-ПЛАСТ», 140015, Московская обл., Люберецкий район,
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 16, строение литера Б, помещение 1,
ОГРН 1175027016273

Реклама